



**CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR (OMS)
PORTARIA SAS/MS Nº 200 DE 25/02/2013**



Declaro para os devidos fins de solicitação de medicamentos para tratamento da Dislipidemia, que o(a) paciente _____ satisfaz os seguintes critérios:

CRITÉRIOS	PONTOS
História familiar	
Familiar de primeiro grau com doença aterosclerótica prematura (homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 60 anos)	1
Familiar de primeiro grau com LDL-C acima do percentil 95	
Familiar de primeiro grau com xantoma tendinoso e/ou arco córneo	2
Criança (menores de 18 anos) com LDL-C acima do percentil 95	
História clínica	
Paciente com doença arterial coronariana prematura (homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 60 anos)	2
Paciente com doença arterial cerebral ou periférica prematura (homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 60 anos)	1
Exame físico	
Xantoma tendinoso	6
Arco córneo antes dos 45 anos	4
Exames laboratoriais	
LDL-C maiores ou iguais a 330 mg/dL	8
LDL-C entre 250 e 329 mg/dL	5
LDL-C entre 190 e 249 mg/dL	3
LDL-C entre 155 e 189 mg/dL	1
Mutação genética presente	8
TOTAL DE PONTOS	

Diagnóstico de hipercolesterolemia familiar é:	
Definitivo com	Mais de 8 pontos
Provável com	6-8 pontos
Possível com	3-5 pontos

Assinatura e carimbo médico (a)

Local e data