

## RESPOSTA AO RECURSO

CANDIDATA: BARBARA DOS SANTOS SAKR

### RESUMO DO RECURSO

#### ÍTEM #1

##### Nº Questão 16

Na revisão da unifesp 2007 paciente com pneumonia vai apresentar no exame físico, presença de diminuição do murmúrio vesicular, aceitando então letra “c” como gabarito correto.

“ O achado clássico ao exame é o da síndrome de condensação, na qual temos, em uma área localizada:

- à palpação, frêmito tóraco-vocal aumentado;
- à percussão, macicez ou sub-macicez;
- à ausculta, murmúrio reduzido com crepitações (ou estertores) e sopro tubário;
- à ausculta da voz (manobra pouco realizada por sua menor relevância clínica), broncofonia, egofonia e pectorilóquia afônica.

Este conjunto de achados, porém, raramente está presente na sua totalidade. O dado mais freqüente no exame físico é o achado localizado de crepitações à ausculta.

Não é rara a presença de derrame pleural em pacientes com pneumonia. Neste caso, os achados de exame físico do derrame pleural podem prevalecer e termos frêmito tóraco-vocal diminuído, macicez e abolição do murmúrio vesicular.

É fundamental a contagem da freqüência respiratória em pacientes com suspeita de pneumonia, pois o achado de taquipnéia, principalmente se acima de 30 incursões por minuto, correlaciona-se fortemente com a gravidade do quadro e risco de óbito”. UNIFESP 2007.

#### ÍTEM #2

##### Nº Questão 34

Gabarito dado como correto foi alternativa “a”, porém a lesão causada pela *Borrelia burgdorferi*, possui lesão com area esbraquuiçada ao centro, senod

contraria a informação contida no caso, que afirma que lesão centra é escura ao centro. Solicito anulação da questão.

Segundo fonte da Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

A doença de Lyme (ou borreliose de Lyme) é uma doença causada pela bactéria espiroqueta *Borrelia burgdorferi*.

O vetor da infecção é geralmente a picada de um carrapato infectado, apresentação da doença varia bastante, podendo, em seus estágios iniciais, incluir erupção cutânea e sintomas parecidos com os da gripe, e então manifestações musculoesqueléticas, artríticas, neurológicas e cardíacas. Na maioria dos casos, os sintomas podem ser eliminados com antibióticos, especialmente se o tratamento é iniciado precocemente. O tratamento tardio ou inadequado geralmente desenvolve o "estágio tardio" da doença de Lyme, que é debilitante e difícil de ser tratado.

“ À infecção devido à picada da carraça ou carrapato, segue-se um período de incubação de três dias a um mês. A doença prossegue então exceto se interrompida por tratamento eficaz. Na pele ao redor da zona da picada surge o eritema migrante, mancha vermelha redonda que cresce até cerca de 5-50 centímetros de diâmetro, com clareamento da zona central”

Segundo Doença de Lyme: Diagnóstico e tratamento 2007, pagina

“ As manifestações clínicas, o rash cutâneo mede 1/2cm de diâmetro, demonstra expansão centrífuga e lenta, mas também pode expandir se rapidamente. Possui a região central mais clara ou avermelhada”

ÍTEM #3

Nº Questão 97

1. Solicito revisão da questão 97, segundo Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma – 2012, pagina S23, afirma que as retrações da musculaturas acessórias exprimem sinais de gravidade da crise de asma, contudo, a opção “e” esta correta.

## RESPOSTA

### ÍTEM #1

O quadro clínico acima é claro e a alternativa A contempla a alternativa correta uma vez que, a diminuição do murmúrio vesicular ocorre em detrimento da estertoração crepitante fina e nunca isoladamente, como equivocadamente interpretou a candidata.

Portanto o recurso está INDEFERIDO, devendo a questão ser mantida

Resposta – A. Barbara Bates- BATES' GUIDE TO PHYSICAL EXAMINATION AND HISTORY TAKING

### ÍTEM #2

Resposta correta A. A doença de Lyme causada pela espiroqueta *Borrelia burgdorferi* muitas vezes é um problema diagnóstico pois pode simular várias condições e por isso é tida como uma grande imitadora. Muitos de seus sintomas se assemelham aos de outras doenças. Isso torna mais difícil de diagnosticar corretamente, especialmente quando não há erupção característica. O eritema migrans da doença de Lyme pode assumir vários aspectos. Num deles a erupção lembra um "olho de boi", aparecendo como um anel vermelho em torno de uma área livre com um centro vermelho um pouco mais escuro.

Resposta B é incorreta. A *Brucella species* entra no organismo através da ingestão de leite contaminado ou através de contato direto com material pecuário contaminado. É uma bactéria intracelular que causa febre ondulante, fraqueza, dor no corpo e perda do apetite. A lesão cutânea se apresenta como eritema nodoso.

Resposta C é incorreta. A doença causada pela *Francisella tularencis* é caracterizada por uma lesão cutânea bem demarcada com uma base muito escura, necrótica ou ulcerada, na área da picada. Cerca de 20% dos pacientes com tularemia tem uma erupção cutânea, que pode começar como uma pequena lesão eritematosa, macular ou maculopapular que progride para uma lesão úlcero-pustulosa, muitas vezes concomitantemente com adenopatia regional. O eritema nodoso e eritema multiforme são raros. O diagnóstico precoce é importante pois a doença pode evoluir desfavoravelmente com óbito. É diagnóstico diferencial com a doença de Lyme.

Resposta D é incorreta. A nocardiose disseminada pode dar um comprometimento cutâneo como paniculite e eritema nodoso mas geralmente o contexto é de um comprometimento pulmonar em pacientes primariamente imunodeprimidos.

Resposta E é incorreta. A Yersinia pestis é um bacilo gram negativo. As lesões cutâneas estão associadas a bubões que representam intumescência de linfonodos em pacientes infectados após picadura pela pulga contaminada

ÍTEM #3

NÃO EXISTE RESPOSTA CORRETA. QUESTÃO ANULADA.

CONCLUSÕES

ÍTEM #1 INDEFERIDO

ÍTEM #2 INDEFERIDO

ÍTEM #3 DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA

Florianópolis, 09 de abril de 2014

BANCA EXAMINADORA