



FORMULÁRIO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS
ATRAVÉS DO CEF/SC PARA O TRATAMENTO DE
DISTÚRBO MINERAL E ÓSSEO NA DOENÇA RENAL CRÔNICA
PORTARIA CONJUNTA Nº 15, de 04 de AGOSTO de 2022



DESFERROXAMINA

Declaro para fins de solicitação do medicamento **Desferroxamina** para o tratamento de Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica, que o(a) paciente _____ não apresenta critérios de exclusão e satisfaz os seguintes **CRITÉRIOS DE INCLUSÃO**:

Para realização do teste para diagnóstico de excesso de Alumínio

Apresenta as condições **(1, 2 ou 3)** conforme assinalado abaixo:

- | | |
|-----|---|
| () | 1. Dosagem sérica não estimulada de Alumínio elevada (60 mcg/L a 200 mcg/L) e dosagem de ferritina maior que 100 ng/mL.
Anexar: <u>Relato médico</u> com descrição dos sinais e sintomas; dosagem de ferritina (validade trimestral) e dosagem sérica de Alumínio (trimestral). |
| () | 2. Sinais e sintomas clínicos sugestivos de intoxicação por Alumínio e dosagem de ferritina maior que 100 ng/mL.
Anexar: <u>Relato médico</u> com descrição dos sinais e sintomas; dosagem de ferritina (validade trimestral). |
| () | 3. Pré paratireoidectomia (PTX) em paciente com histórico de exposição ao Alumínio.
Anexar: <u>Relato médico</u> com histórico da exposição e encaminhamento para PTX ; |

Para o tratamento da intoxicação alumínica

Apresenta as condições **(1 e/ou 2)** conforme assinalado abaixo:

- | | |
|-----|--|
| () | 1. Diagnóstico de intoxicação alumínica detectada por depósito de Alumínio em biópsia óssea.
Anexar: <u>Relato médico</u> com descrição dos sinais e sintomas; <u>laudo de biópsia óssea</u> com avaliação de depósito de Alumínio; <u>dosagem sérica de Alumínio</u> ; <u>avaliação oftalmológica</u> e <u>avaliação otorrinolaringológica</u> (devido à neurotoxicidade visual e auditiva). |
| () | 2. Paciente sintomático com diagnóstico de intoxicação por Alumínio após teste positivo com desferroxamina.
Anexar: <u>Relato médico</u> com descrição dos sinais e sintomas; <u>teste com desferroxamina</u> para diagnóstico de excesso de Alumínio (dosagem sérica de Alumínio não estimulada e dosagem sérica de Alumínio após estímulo com desferroxamina); <u>avaliação oftalmológica</u> e <u>avaliação otorrinolaringológica</u> (devido à neurotoxicidade visual e auditiva). |

Critérios de EXCLUSÃO:

- Pacientes **gestantes ou lactantes** com DMO-DRC estágios 2 a 5D.
- Concentração sérica de Alumínio não estimulada > 200 mcg/L (risco de neurotoxicidade). O programa de terapia renal substitutiva deve ser intensificado para diminuição do nível de Alumínio antes de receber a DFO.

Assinatura e carimbo do(a) médico(a)

_____/_____/_____
Data