

SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS (SCA)	
Portaria SAS/MS nº 2.994 - 13/12/2011	
Medicamento	CLOPIDOGREL
CID 10	I20.0, I20.1, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.6, I23.8, I24.0, I24.8 e I24.9
Apresentação	75mg (comprimido)
Inclusão	<p>– Síndrome Coronariana Aguda Sem Supra (SCASSST):</p> <p style="padding-left: 20px;">A.1 – Angina Instável (AI)</p> <p style="text-align: center;">OU</p> <p style="padding-left: 20px;">A.2 – Infarto agudo do miocárdio SEM supradesnivelamento do segmento ST (IAMSSST)</p> <p>OU</p> <p>– Síndrome Coronariana Aguda com Supra ST (SCACSST):</p> <p style="padding-left: 20px;">B.1 – Infarto agudo do miocárdio COM supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST):</p> <p style="padding-left: 40px;">B.1.1. – Pacientes não submetidos à Intervenção Coronária Primária (com ou sem terapia fibrinolítica),</p> <p style="text-align: center;">OU</p> <p style="padding-left: 40px;">B.1.2. – Pacientes com implante de stent (convencional ou farmacológico).</p> <p>E</p> <p>– Pacientes em uso de AAS ou com hipersensibilidade ou intolerância gastrointestinal ao AAS.</p>
Anexos Obrigatórios	Formulário Médico para SCA.
Administração	<ul style="list-style-type: none"> • IAMSSST – 75mg/dia; • IAMCSST – 75mg/dia.
Prescrição Máxima Mensal	31 cp
Monitoramento	A critério médico.
Exclusão	<ul style="list-style-type: none"> • Hipersensibilidade ou intolerância ao medicamento; E/OU • Úlcera péptica; E/OU • Hemorragia intracraniana.
Tempo de Tratamento	<ul style="list-style-type: none"> • IAMSSST: <ul style="list-style-type: none"> - 75mg/dia por 9 meses; - Caso o paciente apresente risco de sangramento aumentado, o clopidogrel deve ser mantido por no mínimo 4 semanas. • IAMCSST: <ul style="list-style-type: none"> - Pacientes não submetidos à ICP (com ou sem terapia fibrinolítica) manter clopidogrel 75mg por no mínimo 4 semanas, podendo se estender por 9 meses; - Pacientes com implante de stent (convencional ou farmacológico), manter clopidogrel 75mg por 9 meses. • Em casos de hipersensibilidade ou intolerância gastrointestinal ao AAS, deve ser utilizado clopidogrel 75mg/dia por 9 meses, conforme protocolo.

	<p>•Diante da necessidade de continuação do tratamento, o estabelecimento hospitalar deverá entregar no dia da alta, 30 (trinta) comprimidos ao paciente até que seja adquirido pelo Componente Especial da Assistência Farmacêutica (CEAF).</p> <p>•Alerta: Suspensão para Cirurgias. Deve ser descontinuado de 5 a 7 dias antes de cirurgias para minimizar riscos de sangramento.</p>
Especialidade Médica	Sem especialidade médica necessária.
Observação: Não foi disponibilizado pelo MS o Termo de Esclarecimento e Responsabilidade.	
<p>CID-10:</p> <p>I20.0 Angina instável</p> <p>I20.1 Angina pectoris com espasmo documentado</p> <p>I21.0 Infarto agudo do miocárdio</p> <p>I21.2 Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações</p> <p>I21.3 Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada</p> <p>I21.4 Infarto agudo subendocárdico do miocárdio</p> <p>I21.9 Infarto agudo do miocárdio não especificado</p> <p>I22.0 Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior</p> <p>I22.1 Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior</p> <p>I22.8 Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações</p> <p>I22.9 Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada</p> <p>I23.0 Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio</p> <p>I23.1 Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio</p> <p>I23.2 Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio</p> <p>I23.3 Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio</p> <p>I23.4 Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio</p> <p>I23.5 Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio</p> <p>I23.6 Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio</p> <p>I23.8 Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio</p> <p>I24.0 Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio</p> <p>I24.8 Outras formas de doença isquêmica aguda do coração</p> <p>I24.9 Doença isquêmica aguda do coração não especificada</p>	

